

## ЕТИКЕТКА

щодо застосування

Обліпихових супозиторіїв з олією чайного дерева, 1.4

# «Облепіол»

гігієнічно-профілактичний засіб

**Загальна характеристика.** Обліпихові супозиторії «Облепіол» представляють собою гігієнічно-профілактичний засіб, який виготовляють на основі твердого жиру, діючою речовиною в якому є концентрат олій обліпихи та чайного дерева. Один супозиторій містить одну дозу. Супозиторії мають кулеподібну форму від світло-помаранчевого до темно-помаранчевого зі специфічним запахом. Дозволено наявність білого нальоту на поверхні супозиторія.

**Склад.** Обліпихова олія з вмістом суми каротиноїдів у перерахунку на бета-каротин 240 мг% – 0,5 г, олія чайного дерева – 0,02 г.

**Допоміжні речовини:** твердий жир, controх vр.

**Форма випуску.** Супозиторії.

**Основна дія.** Діючими речовинами супозиторіїв є концентрати олій обліпихової та чайного дерева. Обліпихова олія, завдяки наявності жиророзчинних біоантиоксидантів та флавоноїдів, знижує інтенсивність вільнорадикальних процесів та сприяє захисту клітинних мембран від ушкодження. В комбінації, олії обліпихи та чайного дерева, стимулюють репаративні (відновні) процеси, прискорюють загоювання уражених ділянок, мають певну антибактеріальну дію та зменшують запальні процеси. Стимулює регенерацію тканин при ураженнях шкіри та слизових оболонок.

**Показання до застосування.** Застосування в якості гігієнічно-профілактичного засобу *ректально*- для покращення загоєння та зменшення симптомів при анальних тріщинах, геморої та виразки прямої кишки, для відновлення імунітету стінки товстої кишки при проведенні променевої терапії; *вагінально*-сприяють загоєнню ранок, які виникають на слизових оболонках, зволоженню та живленню тканин, що вистилають піхву і шийку матки. Зменшують больові синдроми, викликані різними гінекологічними захворюваннями, сприяють регенерації клітин і відновленню уражених ділянок.

**Побічна дія.** Препарат зазвичай добре переноситься, в поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

**Протипоказання.** Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

**Спосіб застосування та дози.** Супозиторії застосовують *вагінально*- по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом (8-12) днів; *ректально*- по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом (7-10) днів. Вводять супозиторій якомога глибше, попередньо звільнивши від контурної упаковки.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С – 2 роки від дати виготовлення.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Не встановлена.

**Упаковка.** По 5 супозиторіїв в блістері, по 1 або 2 блістери в паці.

**Не є лікарським засобом.**

**Виробник.** Приватне акціонерне товариство «Леххім-Харків»

**Адреса.** Україна, 61115, Харківська область, м. Харків, вулиця Северина Потоцького, будинок 36.

**ТУУ 20.4-22676945-007:2019**